

BULLETIN D'INSCRIPTION

Contacts : SFPIORA 9 rue du Tribunal 67300 Schiltigheim ; tél. : 03 88 81 05 55
ou sfpio-alsace@orange.fr

Le Docteur :

Adresse :

.....

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Cotisation année 2013 :190 euros

incluant :

- L'accès à toutes les séances (conférences, séances TP, buffets)
- l'abonnement à la revue Objectif Paro
- la réduction de l'inscription au congrès SFPIO Deauville 2013

Participation par séance : 85 euros ; Séance TP : 110 euros
Chèques libellés à l'ordre de SFPIO Région Alsace

Les partenaires de La Société Française de Parodontologie et d'Implantologie Orale

PLATINIUM



PIERRE FABRE
ORAL CARE



GOLD



P&G Professional Oral Health



CLASSIQUE



SWISS DENTAL INSTRUMENTS MANUFACTURE
DEPPELER



FABHER Medical



SFPIO

Société Française de Parodontologie
et d'Implantologie Orale



REGION ALSACE

Jeudi 14 Mars

20h, Hôtel Mercure, place de Bordeaux, Strasbourg



Docteur Nicolas Picard

Traitement esthétique du maxillaire en implantologie

info congrès SFPIO 2013 à Deauville - www.sfparo.org



FORMATION
VALIDANTE
CNFCO

Confirmation des dates et lieux des différentes manifestations,
tout au long de l'année sur notre site www.sfpio-alsace.com

Jeudi 14 Mars
20h, Hôtel Mercure Place de Bordeaux, Strasbourg

2 CONFÉRENCES
20 CRÉDITS
PAR CONFÉRENCE

Traitement esthétique du maxillaire en implantologie
Dr Nicolas Picard (Paris)

Jeudi 14 Novembre
20h, Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg

Les bactéries en parodontologie : bien les connaître pour mieux les combattre
Dr Catherine Bisson (Nancy)

Conférences-Débat

Samedi 29 Juin
18h, Hôtel à l'Etoile, Mittelhausen

2 CONFÉRENCES
20 CRÉDITS
PAR CONFÉRENCE

Séance spéciale présentée par les Diplômes Universitaires
avec les Drs Victor Anadon, Omer Bogen et Narendra Seelam

Jeudi 3 Octobre
20h, Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg

Actualité scientifique en paro-implantologie : revue de littérature et applications cliniques
avec les Drs Jean-Nicolas Hasson, Olivier Huck et Yves Reingewirtz

Travaux Pratiques (40 crédits) et Ateliers cliniques (20 crédits)

Jeudi 23 Mai
19h30, Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg

Travaux Pratiques : Expansion et condensation osseuse ; splinting des crêtes minces
Avec la collaboration des Laboratoires Meisinger, Dexter, Straumann, et WH

Jeudi 12 Décembre
20h, Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg

Ateliers cliniques : Etude de cas simples et complexes, de l'étape du diagnostic parodontal à la thérapeutique de soutien

Jeudi 14 Mars, 20h, Forum de la Faculté de Médecine

Traitement esthétique du maxillaire en implantologie
par le Docteur Nicolas Picard
Diplôme Universitaire en parodontologie et implantologie orale,
Université Paris VII



Le succès des thérapeutiques implantaire a longtemps été évalué à la lumière unique de l'ostéointégration. Si ce critère reste bien entendu prépondérant, de nouvelles exigences sont apparues parmi lesquelles l'intégration esthétique des restaurations implanto portées dans le secteur antérieur. Cette intégration esthétique, particulièrement délicate à obtenir, dépend principalement de deux paramètres :

- Un positionnement tridimensionnel adapté de l'implant (Buser & coll. 2004) : dans le sens mésio distal, l'implant devra être situé à 2mm de la dent adjacente ; dans le sens apico coronaire, l'implant devra être positionné 3mm apicalement au niveau de la future gencive marginale ; enfin dans le sens vestibulo palatin, l'implant devra être positionné 1mm en arrière d'une ligne virtuelle passant par le point d'émergence des dents adjacentes.
- La qualité et la quantité des tissus mous péri implantaire : qui devront être en adéquation avec les tissus mous adjacents.

Ces deux paramètres sont intimement associés dans l'obtention de l'intégration esthétique. Ainsi, une étude de Nisapakultorn & coll. (2010) démontre que la position de la gencive marginale dépend à la fois du biotype parodontal, du niveau de la crête marginale et de la position de l'implant.

Ces deux paramètres sont sous la dépendance du volume osseux disponible. Or dans le secteur antérieur esthétique, le volume osseux est souvent restreint. Ainsi les travaux de Huynh & coll. (2010) indiquent que 87 % des corticales vestibulaires présentent une épaisseur inférieure à 1 mm. Outre ces limites anatomiques, le volume osseux disponible va en plus subir des remaniements importants suite à l'extraction dentaire. Schropp & coll. (2003) démontrent ainsi que l'extraction se traduit chez l'homme par une perte osseuse horizontale touchant 50 % du niveau de la crête originale (66 % de cette perte osseuse se produit au cours des 3 premiers mois).

Le but de cette présentation est d'évaluer les différentes situations cliniques auxquelles nous pouvons être confrontés et d'aborder leur traitement afin de rendre prédictible l'obtention d'un résultat esthétique.

Récapitulatif chronologique du programme SFPIO - SFPIO Alsace 2013

- Jeudi 12/03 :** Dr Nicolas Picard « Traitement esthétique du maxillaire en implantologie »
- Jeudi 23/05 :** Travaux Pratiques : Expansion et condensation osseuse ; splinting des crêtes minces
- 6-9/06 :** Congrès international SFPIO à Deauville (hors cotisation sfpio Alsace)
- Samedi 29/06 :** Conférences-Débat « Séance spéciale DU » à Mittelhausen Drs V Anadon, O Bogen et N Seelam
- Jeudi 3/10 :** Conférences-Débat « Actualité scientifique en paro-implantologie : revue de littérature et applications cliniques » Drs JN Hasson, O Huck et Y Reingewirtz
- Jeudi 14/11 :** Dr Catherine Bisson « Les bactéries en parodontologie: bien les connaître pour mieux les combattre »
- Jeudi 12/12 :** Atelier clinique : étude de cas simples et complexes, de l'étape diagnostique à la thérapeutique de soutien